

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI PADA
SATU JAM PERTAMA SETELAH MELAHIRKAN (Studi Kualitatif di RSBN,
Kabupaten Boyolali Tahun 2008)

Tri Yuliani -- E2A004084
(2008 - Skripsi)

Awal menyusui yang baik adalah 30 menit sampai satu jam setelah bayi lahir karena dapat merangsang pengeluaran ASI selanjutnya. Ini merupakan Awal suatu *life sustaining breastfeeding relationship* antara ibu dan bayi. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2002-2003 menunjukkan hanya sekitar 38,7 % balita di Indonesia yang mendapat ASI pada satu jam pertama setelah lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberian ASI pada satu jam pertama dan faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan pemberian ASI pada satu jam pertama setelah melahirkan pada bayi usia 0 bulan di RSBN Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi pada saat persalinan dan pasca persalinan. Subyek penelitian berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive. Informan adalah orang terkecil subyek dan tenaga kesehatan (Pimpinan RSB, perawat dan bidan). Dalam penelitian ini, semua subyek tidak ada yang memberikan ASInya pada satu jam pertama setelah melahirkan. Faktor *predisposing* yang berupa pengetahuan dan motivasi bersifat negatif. Faktor *enabling* yang berupa aturan sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui dan pelaksanaan aturannya bersifat negatif. Faktor *reinforcing* yang berupa orang terdekat subyek dan tenaga kesehatan bersifat negatif. Faktor penghambat berupa promosi susu formula dan sosial budaya juga memberikan pengaruh negatif terhadap praktik pemberian ASI pada satu jam pertama setelah melahirkan. faktor-faktor tersebut menyebabkan gagalnya praktik pemberian ASI pada satu jam pertama setelah melahirkan.

Kata Kunci: Faktor-faktor, ASI pada satu jam pertama, studi kualitatif.

FACTORS RELATED TO BREASTFEEDING IN THE FIRST HOUR OF DELIVERY (A Qualitative Study at "N" Maternity Hospital, Boyolali Regency, 2008)

The best time to start breastfeeding is 30 minutes to one hour after delivery, as the milk production can be stimulated well. It is a starting point of life sustaining breastfeeding relationship between mother and baby. Demography and Health Survey data in 2002-2003 showed that only about 38.7 % infants in Indonesia were breastfed in the first hour after born. The aims of the study was to know the practice of breastfeeding initiation in the first hour after delivery and the related factors at "N" Maternity Hospital, Boyolali Regency. This qualitative study used indepth interview method and observation during delivery process and after delivery. The subjects were five mothers which were chosen purposively. Informants were the closest persons to the subjects and health providers (director of maternity hospital, nurses, midwives. No subject initiated breastfeeding in the first hour after delivery. Predisposing factors which consist of knowledge and motivation toward breastfeeding were negative. Enabling factors like the rules of ten steps toward

successful breastfeeding and practice's in the hospital were negative. Reinforcing factors like such as support from closest persons and health providers were negative. Another factors such as promotion of formula milk and social culture were also negative toward the initiation of breastfeeding in the first hour after delivery. All of this factors lead to failure of breastfeeding initiation practice in the first hour after delivery

Keyword : Factors, breastfeeding in the first hour, qualitative study